

## Wechsel PSA auf Stationen mit ausschließlich Covid-19 positiven Patienten



### Persönliche Schutzausrüstung (PSA) auf Station wird getragen:

- Im Patientenzimmer
- Beim Wechsel in das nächste Patientenzimmer
- Vom Patientenzimmer bis in den Entsorgungsraum

Was	Wann	Wie	beachten
Schutzbrille mitarbeiterbezogener Einsatz	arbeitstäglich und bei sichtbarer Kontamination	Tauchdesinfektion mit Incidin Plus 0,5% EWZ 30 min	Handschuh- bzw. Händedesinfektion nach Manipulation
FFP2-Maske	Pro Rundgang	verwerfen	Handschuh- bzw. Händedesinfektion nach Manipulation
Gelber Schutzkittel	Pro Rundgang  Und bei sichtbarer Kontamination	verwerfen	
Schürze	Nach jedem Patienten	verwerfen	
1. Handschuhpaar hautnah	Pro Rundgang	Hygienische Handschuhdesinfektion bei Wechsel zum nächsten, 2. Handschuhpaar	Defekte und sichtbare verschmutzte verwerfen
2. Handschuhpaar mit Patientenkontakt	Nach jedem Patienten	verwerfen	Defekte und sichtbare verschmutzte verwerfen

Der Pflegewagen wird nach jedem Rundgang und nach Ablegen der Schutzkleidung außen wischdesinfiziert einschließlich der Türgriffe und Griffleisten von Schubladen. Nachfüllbedarf wird mit desinfizierten Händen aus dem Lager geholt und mit Handschuhen aufgefüllt. Handschuhe ausziehen, Hände desinfizieren.

### Schutzkleidung wird nicht getragen:

- Im Stützpunkt
- Im Lager
- Im Spritzenzimmer
- Im Aufenthaltsraum
- Im Arztzimmer
- Auf der Personaltoilette